




Laparoscopische gastric sleeve

De mini gastric bypass werkt op gelijkaardige wijze als de gastric bypass.

De ingreep wordt laparoscopisch uitgevoerd, dit wil zeggen meestal via 5 kleine insneden tussen 5 en 12 mm lang ter hoogte van de bovenbuik.

Een kleine maag wordt gemaakt waarop een lange dunne darmlijs wordt aangesloten (een "omega" montage).



Een bypass werkt op verschillende wijzen:

- restrictie: beperking van de voedselinname door het kleine maagvolume;
- malabsorptie: slechts de helft van de calorieën wordt opgenomen, door de aanwezigheid van de "Y" montage;
- afname hongergevoel, daar geen voedsel meer in het maaglichaam terecht komt (hormonale mechanisme);
- dumpingklachten indien de patiënt zou snoepen (misselijk voelen, zweten, maagkrampen, zich onwel voelen) waardoor een afkeer voor het snoepen ontstaat.

Het gewichtsverlies na deze ingreep is vergelijkbaar met een standaard gastric bypass.



Een nieuwe start, na obesitas chirurgie, biedt U een tweede kans op een nieuw en gezond leven.

Veel succes met uw behandeling!

Dr. Fernando Sirbu
Obesitas chirurg – GZA ziekenhuizen, Antwerpen

VOORDELEN:

Langdurige, aanzienlijke gewichtsreductie mogelijk, dit met voorbehoud van een goede levenskwaliteit. Gevarieerd en gezond eten blijft mogelijk (vlees, groente, fruit, brood), het smaak blijft bewaard, de porties worden wel beperkt.

NADELEN:

Complexere ingreep, minder gemakkelijk omkeerbaar en het uitvoeren van een maagonderzoek (gastroscopie) wordt bemoeilijkt maar het blijft steeds mogelijk.

VERWIKKELINGEN

Tijdens de ingreep lek op de naad en bloeding; laattijdig ulcus (maagzweer), soms kan er een inwendige beklemming van de dunne darm optreden: galstenen; alcoholmisbruik werd in de medische literatuur gerapporteerd.

DUUR VAN DE INGREEP

1 uur



Een nieuwe start, na obesitas chirurgie, biedt U een tweede kans op een nieuw en gezond leven.

Veel succes met uw behandeling!

Dr. Fernando Sirbu
Obesitas chirurg – GZA ziekenhuizen, Antwerpen